

(別紙1) 抗HIV薬剤一覧

Ver1.0 (2021年7月19日作成)

※1剤ずつ番号でご記入ください

※「その他」を選択した場合は具体的な薬剤名をご記入ください

	薬剤名	略称
1	アイセントレス	RAL
2	インテレンス	ETR
3	エジュラント	RPV
4	エピビル	3TC
5	エプジコム	ABC/3TC
6	エムトリバ	FTC
7	オデフシイ	ODF
8	カレトラ	LPV/RTV
9	ゲンボイヤ	GEN
10	コムプレラ	CMP
11	コンビビル	AZT/3TC
12	ザイアジェン	ABC
13	シーエルセントリ	MVC
14	シムツーザ	SMT
15	ジャルカ	DTG/RPV
16	スタリビルド	STB
17	ストックリン	EFV
18	ゼリット	d4T
19	ツルバダ	TDF/FTC
20	デシコビ	TAF/FTC
21	テビケイ	DTG
22	ドウベイト	DTG/3TC
23	トリーメク	TRI
24	ノービア	RTV
25	ビクタルビ	BIC/TAF/FTC
26	ピフェルトロ	DOR
27	ビラセプト	NFV
28	ビラミューン	NVP
29	ビリアード	TDF
30	プリジスタ, プリジスタナイーブ	DRV
31	プレジコビックス	PCX
32	ラバミコム	EPZ
33	レイアタツ	ATV
34	レクシヴァ	FPV
35	レトロビル	AZT
36	レトロビル静注 (静注)	AZT(静注)
37	レトロビルシロップ (シロップ)	AZT (シロップ)
0	その他 (薬剤名をご記入ください)	

(別紙2) 臨床病期 CDC による具体的な症状・診断一覧

※当てはまる症状全てをご記入ください。

1	N	無症状
2	A	リンパ節腫脹 (3ヵ所以上で0.5cm以上, 左右対称は1ヵ所とする)
3	A	肝腫大
4	A	脾腫大
5	A	皮膚炎
6	A	耳下腺炎
7	A	反復性/持続性の上気道感染
8	A	反復性/持続性の副鼻腔炎
9	A	反復性/持続性の中耳炎
10	B	30日以上続く貧血 (8g/dL未満)
11	B	30日以上続く白血球減少 (1000/mm ³ 未満)
12	B	30日以上続く血小板減少 (10万/mm ³ 未満)
13	B	細菌性髄膜炎 (1回)
14	B	細菌性肺炎 (1回)
15	B	細菌性敗血症 (1回)
16	B	細菌性口腔カンジダ症 (鵝口瘡, 生後6ヵ月をこえる小児に2ヵ月以上持続)
17	B	心筋症
18	B	サイトメガロウイルス感染症 (生後1ヵ月未満で発症)
19	B	再発性または慢性の下痢
20	B	肝炎
21	B	ヘルペス口内炎 (再発性で1年以内に2回以上)
22	B	単純ヘルペスウイルス気管支炎 (生後1ヵ月未満で発症)
23	B	単純ヘルペスウイルス肺炎 (生後1ヵ月未満で発症)
24	B	単純ヘルペスウイルス食道炎 (生後1ヵ月未満で発症)
25	B	帯状疱疹 (少なくとも2回以上もしくは皮膚節1ヵ所以上)
26	B	平滑筋肉腫
27	B	リンパ球性間質性肺炎/肺リンパ節過形成
28	B	腎症
29	B	ノカルジア症
30	B	持続性の発熱 (1ヵ月以上)
31	B	トキソプラズマ症 (生後1ヵ月未満で発症)
32	B	播種性水痘 (合併を伴う水痘)

(次ページへ続く→)

33	C	多発性または再発性重度細菌性感染症 (6歳未満で発症したもの)
34	C	カンジダ症 (気管、気管支、肺、食道)
35	C	全身性コクシジオイデス症 (肺または頸部・肺門リンパ節以外の部位)
36	C	クリプトコッカス症 (肺外)
37	C	クリプトスポリジウム症 (1ヵ月以上続く下痢)
38	C	サイトメガロウイルス感染症 (生後1ヵ月以降に発症したもので肝臓, 脾臓, リンパ節以外の部位)
39	C	サイトメガロウイルス網膜症 (視力消失を伴うもの)
40	C	HIV脳症 (2ヵ月以上持続)
41	C	単純ヘルペスウイルス (生後1ヵ月以降に発症したもので 1ヵ月以上持続する皮膚粘膜潰瘍, 気管支炎, 肺炎, 生後 1ヵ月以降に発症する食道炎の原因となる)
42	C	ヒストプラズマ症 (播種性, 肺または頸部・肺門リンパ節以外の部位)
43	C	イソスポラ症 (1ヵ月以上続く下痢を伴ったもの)
44	C	カポジ肉腫
45	C	原発性脳リンパ腫
46	C	非ホジキンリンパ腫 (a, 大細胞型・免疫芽球型、b, Burkitt型)
47	C	全身性または肺結核または肺外性結核
48	C	結核以外の, あるいは菌種不明の全身性抗酸菌症
49	C	全身性Mycobacterium avium (トリ型結核菌) あるいはM. kansasii感染症
50	C	ニューモシスチス・カリニ肺炎
51	C	6歳以上の反復性肺炎
52	C	進行性多巣性白質脳症
53	C	再発性サルモネラ敗血症 (非チフス型)
54	C	トキソプラズマ脳症 (生後1ヵ月以降に発症)
55	C	消耗性症候群 (通常の体重が10%以上減少した時, 少なくとも年齢標準 体重の2つのパーセンタイルの線をこえて減少した時、あ るいは体重減少が5%未満でも30日以上慢性下痢または発熱 が持続する時)